

# Tostop

## ADULTOS

Bromhexina  
160 mg/100 ml



**Alivia**  
el catarro bronquial  
y la tos con flema

SOLUCIÓN ORAL

120 ml  
VENTA LIBRE

SAVANT

# Tostop

## ADULTOS

Bromhexina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN  
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

### ¿Qué contiene TOSTOP ADULTOS?:

TOSTOP ADULTOS tiene 160 miligramos de Bromhexina clorhidrato cada 100 mililitros de solución oral. Otros componentes de la solución oral: Cremophor RH 40; Benzoato de sodio; Sorbitol 70%; Sacarina sódica; Glicerina; Alcohol etílico; Ciclamato de sodio; Ácido tartárico; Colorante rojo allura; Esencia de cereza líquida; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

**Contenido alcohólico: 4,92% P/V**

### ACCIONES:

Mucolítico y expectorante de las secreciones bronquiales.

### ¿Para qué se usa TOSTOP ADULTOS?

TOSTOP ADULTOS es usado para el alivio del catarro bronquial y la tos con flema, facilitando su expectoración.

### ¿Qué personas NO pueden recibir TOSTOP ADULTOS?

Personas con dificultad para expectorar.  
Personas con enfermedad del hígado o enfermedad del riñón.  
Pacientes con asma.  
Niños menores de 12 años.  
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.  
No debe utilizarlo si usted está bajo tratamiento con disulfiram o padece úlcera péptica activa.

### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TOSTOP ADULTOS?

Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera gastrointestinal.  
Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

NOTA: Este medicamento contiene alcohol

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando TOSTOP ADULTOS?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción de la piel,

edema en la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos.

No debe ingerirse este medicamento si usted está tomando al mismo tiempo remedios para la tos.

Efectos sobre la capacidad de conducir y el uso de maquinarias:

La bromhexina debe ser utilizada con precaución para conducir y utilizar máquinas en aquellos pacientes que, durante el período de utilización de la misma, hayan observado mareos.

**SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO.**

**NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS.**

### ¿Cómo se usa TOSTOP ADULTOS?

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml (1 cucharada de sopa) 3 veces por día (cada 8 horas).

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños**

**Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones**

**Policlínico Prof. A. Posadas**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel.: (011) 4961 8447**

### ¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

### FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15° C y 30° C, bien cerrado y al abrigo de la luz.

### PRESENTACIÓN:

1 frasco por 120 ml.

**Tostop**  
**ADULTOS**  
Bromhexina

1004052

Emisión: 04/14

Revisión: 12/12



 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204  
Córdoba, CP: X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico  
E.M.A.M.S. Certificado N° 54705  
Elaborado en Argentina